

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se localiza en la zona litoral norte de la Región de Murcia, repartido entre los términos municipales de San Pedro del Pinatar y San Javier.

El Parque resulta ser una zona costera de unos 7 kilómetros con salinas litorales activas. Limita al sur con las Encañizadas (vía natural de intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo) y por el norte con el Mojón.

Su extensión es de 856 hectáreas, ocupadas en su mayoría por zonas húmedas de elevado valor natural, por ello está incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, fue designado como Zona de Especial Protección para Aves, por lo que queda incorporado a la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y forma parte del ZEPIM Mar Menor y litoral oriental de la Región de Murcia.

La importancia del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se puede entender desde dos puntos de vista. En primer lugar destaca la presencia de numerosas especies de fauna protegida, siendo especialmente importante las aves, por su numerosa presencia. Por otra parte, no podemos dejar mencionar la perfecta coexistencia en este lugar de aprovechamientos tradicionales con la conservación de los valores del medio natural.

La presente guía pretende servir de orientación a aquellos visitantes del Parque interesados en conocer un poco más la flora y fauna. Destacamos las especies más comunes. La primavera es la mejor época para acercarse al parque y disfrutar de la explosión de vida, sonidos y colores.




**FICHA TÉCNICA**  
**Cigüeñuela**  
*Himantopus himantopus*  
Familia Recurvirostridae

Limícola de tamaño mediano, de 35 a 40 centímetros de longitud; de 60 a 70 centímetros de envergadura. Plumaje blanco con alas negras y algo de negro en la cabeza y el cuello, según el sexo y edad del animal. Pico recto, largo y fino, adaptado para capturar pequeños invertebrados en aguas poco profundas. Patas desproporcionadamente largas, de color rojo. Estival y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Ánade real**  
*Anas platyrhynchos*  
Familia Anátidae

Pato grande, de 50 a 60 centímetros de longitud; de 80 a 90 centímetros de envergadura. Plumaje llamativo en los machos; cabeza y cuello verde oscuro irisado, collar blanquecino, pecho castaño, dorso parduzo y alas oscuras con un espejuelo blanco y azul; pico amarillo. Las hembras son de un tono pardo con manchas oscuras. Nidificante escaso en el entorno del Mar Menor; mucho más abundante durante la invernada.



**FICHA TÉCNICA**  
**Tarro blanco**  
*Tadorna tadorna*  
Familia Anátidae

Pato grande y robusto, de 60 a 65 centímetros de longitud; de 100 a 120 centímetros de envergadura. Plumaje blanco, con tonos negro-verdodos en alas, cabeza y cuello. Franja canela en el pecho. Patas y pico rojo. El macho presenta una llamativa protuberancia del pico. Sedentaria y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Flamenco**  
*Phoenicopterus ruber*  
Familia Foenicoptéridas

Ave zancuda muy grande, de 120 a 140 centímetros de longitud; de 150 a 170 centímetros de envergadura. Plumaje blanco rosado, con tonos rojos y negros en las alas. Cuello y patas extremadamente largos. Pico robusto y curvado, adaptado para filtrar el alimento. Sedentaria en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Garza real**  
*Ardea cinerea*  
Familia Ardeidae

Garza de gran tamaño, de 90 a 100 centímetros de longitud; de 150 a 175 centímetros de envergadura. Dorso y alas grises. Cuello y cabeza de color blanco, con franja negra desde el ojo hasta la nuca y se prolonga en un largo penacho. Pico largo, en forma de puñal, adaptado a la pesca. Sedentaria en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Garceta común**  
*Egretta garzetta*  
Familia Ardeidae

Garza de tamaño mediano, de 55 a 65 centímetros de longitud; de 90 a 100 centímetros de envergadura. Cuello largo y flexible. Plumaje completamente blanco. Pico negro, largo y afilado, adaptado para la pesca. Patas largas y negras, con pies amarillos. Sedentaria y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Gaviota picofina**  
*Larus genei*  
Familia Lariidae

Gaviota mediana, de 37 a 42 centímetros de longitud; de 85 a 100 centímetros de envergadura. Plumaje blanco, con gris en las alas y una tonalidad rosada en pecho y vientre. Pico rojizo oscuro, fino y alargado. Patas rojo oscuro. Sedentaria en el entorno del Mar Menor; su población aumenta en invierno.



**FICHA TÉCNICA**  
**Gaviota reidora**  
*Larus ridibundus*  
Familia Lariidae

Gaviota mediana, de 35 a 40 centímetros de longitud; de 85 a 100 centímetros de envergadura. Plumaje blanco, con gris en dorso y alas. La cabeza es de color negro durante el verano; en invierno de color blanco con una mancha oscura en las plumas que cubren el oído. Pico y patas de color rojo. Sedentaria y reproductora en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Vuelvepiedras**  
*Arenaria interpres*  
Familia Scolopacidae

Limícola mediana, de 20 a 23 centímetros de longitud; de 43 a 49 centímetros de envergadura. Plumaje pardo oscuro en cabeza y dorso; vientre blanco. En vuelo luce bandas blancas en alas y cola. Plumaje nupcial con tonalidades rojizas. Patas anaranjadas. Pico robusto, para voltear piedras y otros elementos bajo los que busca alimento. Invernante y en pasos migratorios en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Archibebe común**  
*Tringa totanus*  
Familia Scolopacidae

Limícola de tamaño mediano, de 26 a 28 centímetros de longitud; de 47 a 53 centímetros de envergadura. Plumaje grisáceo, más pálido por el vientre. Patas rojas. Pico largo y fino, de color rojo en su base. Aunque se puede ver durante todo el año se considera principalmente invernante en el entorno del Mar Menor, también aumenta su número durante los pasos migratorios.



**FICHA TÉCNICA**  
**Chorlitejo patinegro**  
*Charadrius alexandrinus*  
Familia Charadriidae

Limícola pequeña, de 14 a 16 centímetros; envergadura entre los 36 y 39 cm. Plumaje parduzco por encima y blanco por debajo. Collar negro incompleto. Pileo y nuca de color castaño rojizo. Pico y patas de color negro. Comportamiento inquieto, en continuo movimiento por las orillas húmedas donde captura pequeños invertebrados. Sedentario y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Avoceta**  
*Recurvirostra avosetta*  
Familia Recurvirostridae

Limícola de tamaño mediano, de 40 a 45 centímetros de longitud; de 65 a 75 centímetros de envergadura. Plumaje blanco, con negro en la cabeza, nuca y alas. Patas azules. Pico largo, fino y curvado hacia arriba, adaptado para capturar pequeños invertebrados en aguas someras. Sedentaria y nidificante en el entorno del Mar Menor; más abundante durante la primavera y el verano.



**FICHA TÉCNICA**  
**Charrancito común**  
*Sterna albifrons*  
Familia Sternidae

Golondrina de mar pequeña, de 21 a 24 centímetros de longitud; de 40 a 45 centímetros de envergadura. Cuerpo compacto, alas muy afiladas y cola ahorquillada. Plumaje blanco, con gris claro en las alas. Capirote negro en la cabeza. Frente blanca. Pico largo y fuerte, adaptado para la pesca; amarillo con punta negra. Estival y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Charrán común**  
*Sterna hirundo*  
Familia Sternidae

Golondrina de mar grande, de 35 a 37 centímetros de longitud; de 70 a 80 centímetros de envergadura. Cuerpo robusto, alas afiladas, cola ahorquillada. Plumaje blanco; gris en dorso y alas. Capirote negro. Pico rojo y fuerte, con la punta negra; adaptado para la pesca. Patas rojas. Estival y nidificante en el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Charrán patinegro**  
*Sterna sandvicensis*  
Familia Sternidae

Golondrina de mar grande, de 37 a 43 centímetros de longitud; de 85 a 95 centímetros de envergadura. Cuerpo robusto. Alas muy afiladas y cola ahorquillada. Plumaje blanco, gris por el dorso y alas. Capirote negro en la cabeza. Patas negras. Pico largo y fuerte, de color negro con el extremo amarillento; adaptado para la pesca. Invernante en el entorno del Mar Menor, más numeroso durante los pasos migratorios.



**FICHA TÉCNICA**  
**Pagaza piconegra**  
*Gelochelidon nilotica*  
Familia Sternidae

Golondrina de mar grande, de 35 a 40 centímetros de longitud; de 57 a 85 centímetros de envergadura. Cuerpo robusto. Alas afiladas y cola ahorquillada. Plumaje blanco; gris en dorso y alas. Capirote negro en cabeza hasta la nuca. Pico negro, muy robusto, adaptado para la pesca. Patas negras.



**FICHA TÉCNICA**  
**Gaviota de Audouin**  
*Larus audouinii*  
Familia Lariidae

Gaviota grande, de 44 a 52 centímetros de longitud; de 115 a 130 centímetros de envergadura. Plumaje blanco. Dorso y alas grises. Punta de las alas y dorso de color negro con gotas blancas. Patas oscuras. Pico característico de color rojo, con negro y amarillo en la punta. Sedentaria en el entorno del Mar Menor; más abundante en invierno. En Isla Grosa, se establece una de las colonias de crías más importantes de la especie a escala mundial.



**FICHA TÉCNICA**  
**Gaviota patiamarilla**  
*Larus cachinnans*  
Familia Lariidae

Gaviota muy grande, de 52 a 58 centímetros de longitud; de 120 a 140 centímetros de envergadura. Plumaje blanco, con gris en las alas y dorso. Punta de las alas negras con gotas blancas. Pico robusto de color amarillento con una mancha roja en la mandíbula inferior. Patas amarillas. Sedentaria, nidificante y muy abundante en todo el entorno del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Fartet**  
*Aphanius iberus*  
Familia Ciprinodontidae

Pez de pequeño tamaño, con aspecto rechoncho. Rara vez supera los 5 cm de longitud total. El macho es más pequeño que la hembra. El diseño de los machos alterna rayas verticales, oscuras y plateadas. Las hembras presentan un aspecto moteado. Especie endémica del Mediterráneo. Actualmente vive en aguas salobres y salinas. Sus mayores poblaciones se concentran en el ámbito del Mar Menor.



**FICHA TÉCNICA**  
**Eslizón ibérico**  
*Chalcides bedriagai*  
Familia Scincidae

Reptil pequeño, con aspecto de serpiente, que no suele superar los 15 cm de longitud total. Cabeza pequeña, con hocico redondeado y ojos pequeños. Cola larga como el cuerpo, ancha en la base y puntiaguda en su extremo. Patas muy cortas. La coloración es pardo clara, con bandas más oscuras en el dorso y costados. El cuerpo y la cola suelen estar salpicados de pequeñas manchas amarillas, con el margen más oscuro. Vientre es un tanto más pálido. Vive en lugares arenosos.



**FICHA TÉCNICA**  
**Lagartija colilarga**  
*Pseudismodromus algirus*  
Familia Lacertidae

Parda u olivácea, con dos bandas amarillentas a cada lado. Los machos en celo, muestran las partes laterales de la cabeza y la garganta de un vivo color ocre anaranjado. Sus escamas dorsales son relativamente grandes. Llegan a medir hasta 30 cm, de los que aproximadamente dos tercios corresponden a la cola. El cuerpo y la cola suelen estar salpicados de pequeñas manchas amarillas, con el margen más oscuro. Vientre es un tanto más pálido. Vive en lugares arenosos.



**FICHA TÉCNICA**  
**Culebra de escalera**  
*Elaphe scalaris*  
Familia Colubridae

Culebra grande y esbelta, con una longitud total de un metro y medio. Cabeza ancha, con hocico puntiagudo. Ojos pequeños, con el iris marrón oscuro. Dorso amarillento o pardo, con 2 rayas oscuras que nacen cerca de la cabeza y llegan hasta el final de la cola. Los juveniles presentan un diseño característico, formado por líneas oscuras que recuerdan los peldaños de una escalera. Los adultos tienen dos líneas dorsales. En el Parque vive en áreas soleadas, con mucho matorral.



**FICHA TÉCNICA**  
**Culebra bastarda**  
*Malpolon monspessulanus*  
Familia Colubridae

Se trata de la culebra más grande de en la Península. Puede medir más de 2 metros de longitud total. Cabeza estrecha y algo puntiaguda. Ojos grandes y con pupila redondeada. Color verde oliva en los adultos y marrón moteado en los jóvenes. Vientre amarillo crema, a menudo con manchas oscuras. En el Parque vive en las dunas costeras, en zonas de matorral mezcladas con claros, siempre que existan refugios adecuados.



**FICHA TÉCNICA**  
**Lagartija coliorroja**  
*Acanthodactylus erythrusus*  
Familia Lacertidae

Lagartija de tamaño mediano. Puede alcanzar una longitud total de 20 cm. Cabeza corta y alta. Cuerpo robusto y extremidades fuertes, las posteriores de mayor longitud. Cola muy larga, de base llamativamente engrosada en el macho. Color muy variable. Dorso gris a pardo-gris, hasta con 10 rayas longitudinales claras. Vientre de color blanquecino. Ocelos claros en los costados. Vive en zonas secas y calientes de suelo arenoso y escasa vegetación. Frecuente junto a playas.

